항생 • 항균제

3세대세파계 광범위 항생제

Ceftiofur Inj.(P) 세프티오퍼 분말주



동물용의약품

■ 성분 및 함량

본제 1g 중 Ceftiofur ······1.000mg(역가)

■ 포장단위

2g(역가), 5g(역가)

■ 휴약기간

• 소 : 3일 • 돼지 : 1일

• 우유 : 12시간



빠르다! 강력하다! 안전하다!

- 1. 3세대 세파계 항생제로 항균력이 강력합니다.
- $2. \beta$ lactam 저항 내성균에도 감수성이 높습니다.
- 3. 주사후 1시간 안에 유효혈중농도에 도달합니다.
- 4. 실온보관이 가능하여 편리합니다.

효능 및 효과

대상 동물	효능·효과	적응증	
소	M. hemolytica, P. multocida, H. somnus, F. necrophorum, B. melaniogenicus에 의한 감염증의 치료	수송열, 폐렴 등 호흡기질병, 지간부란	
돼지	A. pleuropneumonia, P. multocida, S. suis type 2에 의한 감염증의 예방 및 치료	폐렴 등 호흡기 질병	
닭 (초생추)	E. coli, Salmonella sp.에 의한 감 염증의 예방 및 치료	대장균증, 살모넬라증	

용법 및 용량

1g을 주사용증류수 20mL에 용해시켜

대상 동물	용법	용량 및 투약기간
소	근육	체중 50kg당 1~2mL를 1일 1회 주사
돼지	근육	체중 10kg당 0.6~1mL를 1일 1회 주사
닭(초생추) 피하주사 1수당 ceftiofur 0.08~0.2mg의 특 으로 목부위에 주사		1수당 ceftiofur 0.08~0.2mg의 투여량 으로 목부위에 주사

※ 3일 연속 투여가능

저장방법 및 유효기간

- 실온(1~30℃)에 직사광선을 피하여 건조한 곳에 보관
- 건조분말상태: 제조일로부터 24개월
- 주사용증류수로 용해시킨 상태
- 2~8℃ 보관시 7일 이내 사용
- 실온(15~30℃)보관시 12시간 이내 사용