구충제 돼지 내외부 기생충 구제

Imectin-P
이멕틴-P

1회 투여로 효과적으로 내외부 기생충을 동시에 구제하여 증체율향상으로 비육기간이 단축됩니다.

동물용의약품

■ **성분 및 함량**

본제 1kg 중
Ivermectin ·····6.12g

■ **포장단위**

1kg

■ **휴약기간**

돼지 – 도축전 28일

효능 및 효과

• 돼지의 선충류(Ascaris suum, Ascarops strongylina, Hyostrangy rubidus, Oesophgostomum spp.) 및 돈폐충, 돈신충, 이, 개선충의 구제

용법 및 용량

• 구충시 이 제품을 다음의 용량으로 사료에 고르게 혼합하여 7일간 연속하여 경구투여

대상동물	사료섭취량	용량	
		이버멕틴 함량	사료톤당 본제 혼합량
어린돼지(40kg)	50g/kg 체중	2.0	333g/사료ton
육성돈(40100kg)	42g/kg 체중	2.4	400g/사료ton
모돈 200kg	2.0kg/1일	10.0	1.67kg/사료ton
	2.5kg/1일	8.0	1.33kg/사료ton
	3.0kg/1일	6.8	1.11kg/사료ton
웅돈 250kg	2.5kg/1일	10.0	1.67kg/사료ton
	3.0kg/1일	8.5	1.39kg/사료ton

• 모돈 · 웅돈에 개체 투여할 경우는 다음의 공식에 의하여 본제의 혼합량을 계산하여 구충할 돼지가 7일간 섭취할 사료에 혼합하여 투여하십시오.

$$\text{이멕틴P} = \frac{\text{평균체중(kg)} \times \text{구충할 돼지(마리)} \times 7\text{(일)}}{60}$$

주의사항

– 돼지이외의 동물에는 사용하지 마십시오.
(특히, 개에 투약시는 치사될 수도 있습니다.)
– 분만전 28일 이전에는 투약하지 마십시오.