



지속성 광범위 항생물질 주사제



옥시벳 - LA

성 분

본제 1mL 중

옥시테트라사이클린이수화물(Oxytetracycline Dihydrate) 200mg(역가)

효 능 및 효 과

옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 예방 및 치료

1)소

– 치료: 아나플라즈마병(*Anaplasma marginale*), 만헤이미아 폐렴(*Mannheimia haemolytica*), 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella multocida*), 렘토스피라병(*Leptospira interrogans serovar Pomona*), 부제병(*Fusobacterium necrophorum*), 디프테리아(*Corynebacterium diphtheriae*), 전신성 유방염기증저(*Clostridium chauvoei*), 대장균증(*E. coli*), 피부방선균증(*Dermatophilus congolensis*), 제대/관절병, 창상감염증

– 예방: 수송열, 수술 후 및 분만 후 감염증

2)돼지

– 치료: 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella multocida*), 렘토스피라병(*Leptospira interrogans serovar Pomona*)

– 예방: 수송열, 유방염-자궁염-무유증 증후군, (Metritis-Mastitis-Agalactia(MMA) syndrome), 자돈의 대장균증(*E. coli*), 수술 후 및 분만 후 감염증

3)면양

– 치료: 만헤이미아 폐렴(*Mannheimia haemolytica*), 유행성 유산(*Chlamydia psittaci*), 기종저(*Clostridium chauvoei*), 부제병(*Fusobacterium necrophorum*), 전신성 유방염, 자궁염, 제대/관절병, 창상감염증





용법 및 용량

소, 돼지, 면양: 일일 체중 kg당 본제 0.1mL(옥시테트라사이클린으로서 20mg)를 1회 근육주사

※ 중증시는 처음 주사 후 3~5일이 경과한 다음에 재주사 하십시오.

(한부위의 1회 최대 주사량이 소는 10mL, 돼지는 5mL, 면양은 5mL이상 투여되지 않도록 하십시오.)

포장 단위

100ml, 20ml X 5병입

유효 기간

24개월

주의 사항

휴약기간

1)소: 21일 (우유: 7일)

2)돼지: 21일

3)면양: 14일 (양유: 7일)

