

암피실린에 감수성이 있는
세균성 질병의 예방 및 치료

이클암피실린 200



Eagle Ampicillin 200 Soluble Powder

- 송아지·돼지 : 세균성 설사증
- 닭 : 대장균증



암피실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 예방 및 치료!


이클암피실린 200

Eagle Ampicillin 200 Soluble Powder

닭
대장균증

돼지
세균성 설사증

송아지
세균성 설사증



원료약품 및 분량 (본제 1Kg 중)

암피실린수화물(Ampicillin Hydrate, KVP) 200g(역가)
포도당(Glucose, KVP) 적당량

효능 및 효과

암피실린에 감수성이 있는 다음의 세균성 질병의 예방 및 치료

가. 송아지 : 세균성 설사증 나. 돼지 : 세균성 설사증 다. 닭 : 대장균증(Escherichia coli)

용법 및 용량

다음의 용량을 음수 또는 사료에 혼합하여 경구투여

가. 송아지 : 1일 체중 100kg당 본제 2~7.5g (암피실린으로서 400~1,500mg)
나. 돼지 : 1일 체중 10kg당 본제 0.25~1g (암피실린으로서 50~200mg)
다. 닭 : 1일 체중 10kg당 본제 0.5~1g (암피실린으로서 100~200mg)

저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 직사광선을 피하여 실온(1~30℃)에 보관
나. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

사용상의 주의사항

• 휴약기간 : 소, 돼지 - 5일, 닭 - 3일

- 다음 환축에는 투여하지 말 것 : 본제 및 페니실린계 항생물질에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.
- 페니실린계 항생물질은 장내 정상세균총을 억제하여 설사를 유발할 수 있으며, 위장염이나 대장염에 의한 복통, 식욕부진, 수양성 설사 또는 혈변, 오심 및 구토 등의 소화기계 이상을 유발할 수 있습니다.
- 페니실린계 항생물질을 과량 투여시 경련이나 발작 등의 신경계 이상이나 간독성을 유발할 수 있습니다.
- 마크로라이드계(에리트로마이신), 아미노글리코시드계, 콜로람페니콜계 및 테트라사이클린계 항생물질과 병용하지 마십시오.
- 겐타마이신과 브로멜라인 및 프로베네시드는 본제의 약효를 상승시킬 수 있습니다.
- 착유중인 젖소에는 사용하지 마십시오.
- 산란중인 닭에는 사용하지 마십시오.
- 음수 또는 사료에 혼합하여 투여할 경우 균질하게 혼합되지 않으면 약화사고를 초래하거나 투여 목적을 달성할 수 없으므로 골고루 잘 혼합하여 사용하십시오.
- 안전사고 예방을 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관해주십시오.
- 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정해진 저장방법을 준수하십시오.
- 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.

KOSDAQ
코스닥상장법인



건강축산의 동반자
주식회사 이-클 벳

서울사무소 : 서울시 성동구 광나루로 6길 20 이글타운8층 TEL:02)464-9065(代)
본사·공장 : 충남 예산군 신암면 추사로 235-34 TEL:041)331-4100(代)