

# Ketoconazole Tablets

**케토코나졸 정제**



*Malassezia* 및 피부사상균에 의한  
**반려견 피부감염증의 치료**



반려견전용 피부사상균증 치료제!

충남대학교 임상시험으로 입증된 효과!

호서안전성 평가센터에서 검증된 안전성!



# Ketoconazole Tablets

## 케토코나졸 정제



**Malassezia 및  
피부사상균에 의한  
반려견 피부감염증의 치료**



【포장단위】  
200정 / 500정

### 원료약품 및 분량 (본제 1정 (300mg) 중)

케토코나졸(Ketoconazole, 별규) ..... 200mg  
부형제 ..... 적량

### 효능 및 효과

대상동물	적응증
개	Malassezia 및 피부사상균에 의한 피부감염증의 치료

### 용법 및 용량

대상동물	용법	용량 및 투약기간
개	경구 투여	체중 1kg당 케토코나졸로서 10mg을 1일 용량으로 1일 2회 경구 투여(최소 2~4주 동안 투여)

### 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 직사광선을 피하여 건조한 실온(1~30℃)에 보관  
나. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

### 사용상의 주의사항

- 가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것
- 1) 본제 투여시 Allergy 등 과민반응(쇼크)이 일어날 수 있는 동물에는 투여하지 마십시오.
  - 2) 간손상이 있는 동물에는 투여하지 마십시오.
- 나. 부작용
- 1) 구토, 설사 및 식욕 감소 등의 발생이 가능합니다. 부작용 발생시 수의사의 지시에 따라 처치하십시오.
  - 2) 개의 모질과 털 색상에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 다. 상호작용 : 제산제, cimetidine, methylprednisolone, 항경련제, 심장관련 치료제, cyclosporine, theophylline, terfenadine, astemizole 등의 다른 약제들과 동시에 투여하지 마십시오.
- 라. 임신, 수유축, 신생축, 어린가축, 쇠약축 등에 대한 투여
- 1) 임신한 경우에는 투여하지 마십시오.
- 마. 적응상의 주의 : 장기간 연용하여 사용할 경우 간기능 이상 유무를 정기적으로 검사하면서 투여해야 합니다.
- 바. 저장상의 주의사항
- 1) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
  - 2) 안전성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정해진 저장방법을 준수하십시오.
- 사. 기타
- 1) 설명을 충분히 읽어 본 후 사용하십시오.
  - 2) 정하여진 용법용량을 준수하십시오.
  - 3) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
  - 4) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
  - 5) 오·남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.
  - 6) 다 쓴 용기는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.
  - 7) 만약 구입시 유효(사용)기간이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품의 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
  - 8) 기타 제품에 대하여 문의하실 사항이 있는 경우 제조사로 연락하여 주시기 바랍니다.