


린스펙틴-F

LINSPECTIN

질병의 예방과 치료를 동시에!



닭

마이코플라즈마병의 예방 및 치료

돼지

비브리오성 설사, 적리, 살모넬라균증, 대장균성 장염, 마이코플라즈마성 폐렴 등 각종 세균감염증의 예방 및 치료



NEW



- ☑ 염산린코마이신.....44g(역가)
- ☑ 황산스펙티노마이신...44g(역가)

KOSDAQ
코스닥상장법인



건강축산의 동반자
주식회사 이-클벳

수신자부담전화 : 080-022-6644

질병의 예방과 치료를 동시에!



원료약품 및 분량

(본제 1kg 중)

- 염산린코마이신(Lincomycin Hydrochloride, 동물약품공정서) 44g(역가)
- 황산스펙티노마이신(Spectinomycin sulfate, 유럽약전) 44g(역가)
- 부형제 적 량

효능 및 효과

- 1) 닭 : 마이코플라즈마병의 예방 및 치료
- 2) 돼지 : 비브리오성 설사, 적리, 살모넬라균증, 대장균성 장염, 마이코플라즈마성 폐렴, 포도상구균증, 연쇄상구균증, 관절염, 돈단독, 헤모필러스성 폐렴, 위축성 비염, 자돈설사 등 각종 세균감염증의 예방 및 치료

용법 및 용량

- 1) 닭 : 질병치료시 사료톤당 본 제품 1.5~2.5kg을 첨가하여 5~7일간 급여
- 2) 돼지
 - 질병치료시 : 사료톤당 본 제품 0.5~1.5kg을 첨가하여 1~3주간 급여
 - 질병예방, 사료효율개선 및 증체 목적 : 사료톤당 본 제품 0.125~0.5kg을 첨가하여 급여

저장방법 및 유효기간

- 1) 저장방법 : 직사광선을 피하여 건조한 실온(1~30℃)에서 기밀용기에 보관할 것
- 2) 유효기간 : 제조일로부터 24개월

주의사항

- 1) 금기사항
 - 산란중인 닭에는 사용하지 마십시오.
 - 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 사용하지 마십시오.
- 2) 다음 환축에는 투여하지 말 것 : 본 약제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 동물에게는 사용하지 마십시오.
- 3) 부작용 : 투약후 간혹 연변, 피부발적, 자극성 행동이 나타날 수 있으나 5~8일 이내에 자연 치유됩니다.
- 4) 적용상의 주의사항
 - 설명을 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
 - 정하여진 용법용량을 준수하십시오.
 - 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 5) 휴약기간 : 닭, 돼지 - 24시간
 - 휴약기간을 반드시 준수하십시오.
- 6) 저장상의 주의사항
 - 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
 - 안정성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
 - 유효기간이 경과한 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
 - 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.
 - 만약 구입시 유효기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- 7) 기타 주의사항
 - 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
 - 피부나 눈에 접촉시에는 물로 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 있을 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
 - 제품에 대한 문의사항은 본사로 연락하여 주십시오.