


세균성 호흡기 질병과 열을 동시에 -

목사펜 200[®]

아목시실린+아세트 아미노펜

콜~~록!
입맛은 **뚝!**
온몸은 **불** 덩이!



- 20% 고농도의 아목시실린과 아세트아미노펜의 복합처방
- 돼지의 각종 호흡기 및 소화기 질병에 강력한 살균효과
- 특히, 홍막폐렴, 파스튜렐라성 폐렴, 위축성 비염 치료에 탁월한 효과
- 치료농도 도달시간이 매우 빠른 강력한 해열 진통작용
- 용해가 쉽고 투약이 간편하여 노동력 절감




건강축산의 동반자
주식회사 이-클 벳

소비자상담전화 : 080-022-6644

고농도 처방의 돼지 호흡기 질병전문 예방 치료제

목사펜 200[®]



■특장점

호흡기 질병 전문치료제로서 이상적인 배합

목사펜-200은 아목시실린과 아세트아미노펜이 각각 20% 고농도로 처방된 제품입니다.

아목시실린은 암피실린보다 소화관내에서 흡수율이 2~3배 이상 높기 때문에 높은 혈중농도를 유지하여 각종호흡기 병원균에 살균작용을 나타내고, 강력한 해열진통제인 아세트아미노펜은 경구투여시 위장관에 신속히 흡수되어 폐렴 등 열을 동반한 전신성 감염증에 대하여 빠른 해열작용과 감염통증을 완화하는 진통작용을 나타냅니다.

경제적이고 간편한 치료제

목사펜-200은 항생제인 아목시실린 단독 사용할 때 보다 아세트아미노펜과 복합 사용시 질병을 빠르게 회복시키므로 열을 동반하는 돼지의 호흡기 질병치료에 효과가 탁월합니다.

광범위한 적응증

호흡기 질병뿐만 아니라 대장균성, 살모넬라성 설사에도 확실한 치료효과를 나타냅니다.

■원료 및 함량 (본제 kg중)

아목시실린삼수화물(동물약품공정서)	200g(역가)
아세트아미노펜(대한약전)	200g
포도당(식품공전, 부형제)	적량

■효능 및 효과

아목시실린에 감수성이 있는 돼지의 세균성 질병의 예방 및 치료.

- 특히 돼지의 홍막폐렴, 파스튜렐라 폐렴, 위축성 비염, 대장균성 설사, 살모넬라 감염증에 효과 있음.

■용법 용량

질병치료시 : 1kg당 아래의 양을 1일량으로 하여 음수에 용해하거나 사료에 혼합하여 3~5일간 경구투여한다.

1) 음수투여시 : 체중 1kg당 아래의 양을 1일량으로 하여 3~5일간 투여.

축종	투여량(체중 10kg당 1일량)	
	아목시실린	본제품
돼지(4개월령 이하)	50~100mg	0.25~0.5g

2) 사료첨가시 : 사료톤당 본제 1kg을 혼합하여 3~5일간 투여.

질병예방시 : 상기 용량의 1/2을 투여.

호흡기 질병 발생근절을 위한 단계별 투약프로그램

(투약단계를 맞추어 아래 용량을 사료에 첨가하거나 음수에 용해하여 투여)

투약단계	체중(1두)	투약기간	본제투약용량(100두)	1일 평균 음수량(L/1두)
이유자돈	10kg	3~5일	25~50g	약1L
육성돈 전기	30kg	3~5일	75~150g	약3L
육성돈 중기	50kg	3~5일	125~250g	약4L
육성돈 후기	70kg	3~5일	175~350g	약5L

■저장방법 : 기밀용기에 건조하고 차광된 실온(1~30℃)에서 보관하십시오.

※주의사항 : 페니실린에 과민반응이 있는 동물에는 사용하지 마십시오.

5일은 초과하여 연속투여하지 마십시오.

음수투여시는 투여직전에 조제하여 사용하십시오.

본 제품은 흡습성이 있으므로 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하시고

남은 것은 본래 포장지에 밀폐하여 실온 (1~30℃)에서 건조하고 차광된 장소에 보관하십시오.

■휴약기간 : 돼지 15일

■포장단위 : 1kg × 10EA



건강축산의 동반자
주식회사 이-클 벳