



세프트이오퍼에 감수성이 있는 세균성질병의 치료

세프레스 현탁주

100mg

결정성세프트이오퍼유리산



에 의한
돼지호흡기질병
(SRD)의 치료



Ceftiofur Crystalline Free Acid

CefRes Inj.

포장단위 20mL, 50mL, 100mL, 200mL, 250mL



세프티오퍼에 감수성이 있는 세균성질환의 치료

세프레스 현탁주

100mg

결정성세프티오퍼유리산

돼지
호흡기질환
(SRD)의 치료

Ceftiofur Crystalline Free Acid

CefRes Inj.

■ 원료약품 및 분량 (본제 1mL 중)

결정성세프티오퍼유리산(Ceftiofur Crystalline Free Acid, 별규) 100mg
프로필렌글리콜디카프릴레이트(Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, USP) 적당량

■ 효능 및 효과

세프티오퍼에 감수성이 있는 세균성 질환의 치료

대상 동물	효능 및 효과
돼지	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> , <i>P. multocida</i> , <i>H. parasuis</i> , <i>S. suis</i> 에 의한 돼지호흡기질환(SRD)

■ 용법 및 용량

대상 동물	용법 및 용량
돼지	가. 체중 20kg 당 1mL(세프티오퍼로서 100mg)를 1일 1회 근육주사 (단, 한부위에 2mL이상 투여하지 말 것) 나. 3~5일 내에 호전되지 않으면 수의사가 다시 진단하도록 한다.

■ 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 실온(1 ~ 30°C)에 직사광선을 피하여 건조한 곳에 보관
나. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

■ 포장단위

20mL, 50mL, 100mL, 200mL, 250mL

■ 사용상의 주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것 : 본제 및 다른 세팔로스포린계 항생물질에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용 : 근육주사 시 주사부위에 일시적인 통증 등 국소적인 조직 반응이 생길 수 있습니다.

다. 상호작용

- 1) 아미노글리코시드계, 페니실린계 및 클로람페니콜계 항생물질과 병용하지 마십시오.
- 2) 비경구용 아미노글리코시드계 및 암포테리신B 등 신장 독성이 있는 약물과 병용하지 마십시오.

라. 임신, 수유축, 신생축, 어린 가축, 쇠약축 등에 대한 투여

- 1) 임신한 돼지나 교배를 위한 돼지에서 세프티오퍼의 안전성이 입증되지 않았으므로 투여를 신중히 하십시오.
- 2) 임신 중인 동물은 주사 스트레스를 받기 쉬우므로 항상 신중하게 투여하십시오.

마. 적용상의 주의

- 1) 사용 전에 충분히 흔들어서 사용하십시오.
- 2) 사용 전 주사액을 실온 또는 상온이 되도록 유지한 후 사용하십시오.
- 3) 다른 약제와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 4) 멸균된 주사기와 주사바늘을 사용하며 1두 1침의 원칙으로 사용하십시오.
- 5) 주사방법이 잘못되면 통증, 경결 및 화농이 생길 수 있습니다.
- 6) 환경이 불량하거나 주사부위가 오염된 경우에는 주사부위에 염증 및 화농이 생길 수 있으므로 주사부위를 70% 알코올 등으로 깨끗이 소독한 후 사용하십시오.
- 7) 주사 시 주사통증에 의해 접종자가 동물의 공격을 받을 수 있으므로 안전사고에 주의 하십시오.

바. 휴약기간 - 돼지 : 14일

사. 저장상의 주의사항

- 1) 안전사고 예방을 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하십시오.
- 2) 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정해진 저장방법을 준수하십시오.
- 3) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
- 4) 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래 포장용기를 밀봉하여 습기와 광선이 차단된 장소에 보관하십시오.