

세균 / 바이러스 살균 및 소독제

# 터미네이터

*Terminator*



## 터미네이터는 ?

본 제품은 양성 계면 활성제에 속하는 제4급암모늄제(QAC)인 **코코벤질디메틸암모늄 클로라이드**(Cocobenzyl dimethyl ammonium chloride)와 알데하이드 계통의 **글루타알데하이드**(Glutaraldehyde)가 혼합된 제품으로 **효과가 탁월**하면서 **안전성이 뛰어난 광범위 소독제**입니다.



세균 / 바이러스 살균 및 소독제

# 터미네이터

## Terminator

### 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)

[유효성분]

글루타알데하이드(Glutaraldehyde, USP) ..... 150g  
 코코벤질디메틸암모늄 클로라이드(Cocobenzyl dimethylammonium chloride, <QAC>, 별규) ..... 100g

[첨가제]

수산화나트륨(Sodium Hydroxide, BP) 등 ..... 적당량

### 효능 및 효과

1) 본제에 감수성 있는 세균 및 바이러스의 살균 및 소독

- 세 균 : 살모넬라균(*Salmonella typhimurium*), 브루셀라균(*Brucella ovis*)

- 바이러스 : 뉴캐슬병 바이러스(ND virus), 조류인플루엔자바이러스(AI virus), 돼지열병바이러스(CSF virus), 구제역바이러스(FMD virus)

2) 농장, 축사, 기구, 소독조, 차량 등의 살균 및 소독

### 용법 및 용량

소독대상물에 대하여 철저히 세척한 후 다음과 같이 소독을 실시한다.

1) 축사내외부 소독 : m<sup>2</sup>당 희석액 200~300mL(평당 약600~900mL)를 모든 표면이 충분히 적셔지도록 분무한다.

2) 축사기구의 세척 및 소독 : 분무대상 기구가 흠뻑 젖도록 분무한다.

3) 축사공간소독 : 100m<sup>3</sup>당 희석액 1리터를 분무기로 축사공간에 고루 저압연무 분무한다.

대상 질병명		권장 희석배수						
		일반질병(세균)	특정세균	특정바이러스				
소독대상	시험 결과	경수(경)	특정세균	구제역	조류인플루엔자	뉴캐슬병	돼지열병	
			유기물(유)	1:200	1:140	1:200	1:200	1:150
유기물이 적은 소독대상	축사공간 및 축사기구, 일반차량, 도로	[일반세균(경)+ 특정(경)]	800	620	200	300	400	500
		[일반세균(유)+ 특정(유)]	200	140		200	150	300

\* 단, 여러 질병에 대해 동시에 소독할 경우 가장 낮은 희석배수(고농도)로 사용할 것

### 저장방법 및 유효기간

가.저장방법 : 실온(1~30℃)의 건암소에 보관

나.용기종류 : 기밀용기

다.사용기간 : 제조일로부터 36개월

### 사용상의 주의사항

가.저장상의 주의사항

(1) 사용후에는 밀봉하여 직사광선을 피하여 어린이의 손이 닿지 않는 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.

(2) 유효기간이 경과 시, 안전하게 폐기처리 하십시오.

나.기타 주의사항

(1) 사용설명서를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

(2) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오

(3) 다른 소독제나 세제와 혼합하여 사용하지 마십시오.

(4) 눈과 피부에 닿으면 자극성이 있으므로 주의하십시오

(5) 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 충분한 양의 물로 15분 이상 잘 씻어내십시오.

(6) 의복에 접촉시에는 즉시 닦아내고 몸을 깨끗이 씻어내십시오.

(7) 취급 시에는 적당한 보호장갑, 보안경, 마스크를 착용하고 취급 후에는 몸을 깨끗이 씻으십시오.

(8) 흡입하였을 경우에는 신선한 공기를 마시게 하고 증상이 계속되면 의사의 진료를 받으십시오.

(9) 축체에 사용하지 마십시오.

(10) 소독약품이 흘러들어 농작물피해, 양어장·양식장 폐사, 식수원·하천오염 피해가 발생하지 않도록 주의하십시오.

[제조원]



Elanco New Zealand

[수입판매원]



(주)이글벳

충남 예산군 신암면 추사로 235-34 TEL:041)331-4100(대)  
 수신자부담전화:080-022-6644 / www.eaglevet.com