

슈퍼플로 프라임액

(플로르페니콜)

Superflo Prime sol.

호흡기질환 치료제
· 휴약기간 2일(닭) ·



대장균에 의한
호흡기 질병의
치료

연쇄상
구균증

홍막페렴

파스튜렐라성
페렴


KOSDAQ
코스닥 상장법인



주식
회사 이-클 벳

건강속산의 동반자

수신자부담전화 080-022-6644



슈퍼플로 프라임액

(플로르페니콜)

호흡기질환 치료제 · 휴약기간 2일(닭) ·

- 1 우수한 효과와 검증된 품질** 슈퍼플로 프라임액은 호흡기 질병을 일으키는 주요 세균에 대해서 매우 높은 감수성을 지니고 있습니다. 고순도의 플로르페니콜 원료를 최적의 생산시설(EU-GMP 인증)에서 제조하였습니다.
- 2 신속한 흡수와 조직내 높은 분포** 슈퍼플로 프라임액은 경구 투여 후 1시간 내에 혈액과 폐에서 유효농도 이상으로 분포하므로 호흡기 질병을 빠르고 간편하게 치료할 수 있습니다.
- 3 간편한 음수 투약** 슈퍼플로 프라임액은 음수에 희석하여 투여하므로 주사 스트레스와 노동력을 줄일 수 있으며, 약물은 음수를 통해 빠르게 흡수되므로 신속하게 치료할 수 있습니다.

[원료약품 및 분량] (본제 1L 중)

[유효 성분]	
- 플로르페니콜 (Florfenicol, 별규)	100g
[보 존 제]	
- 벤질알코올 (Benzyl Alcohol, KVP)	10g
[첨 가 제]	
N-메틸피롤리돈, 프로필렌글리콜, 폴리에틸렌글리콜 400, 인산	

[효능 및 효과]

대상동물	효능 · 효과	적응증
닭	E.coli에 대한 항균 작용	대장균에 의한 호흡기 질병의 치료
돼지	Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Streptococcus suis 에 대한 항균작용	홍막폐렴, 파스튜렐라성 폐렴 등 호흡기 질환과 연쇄상구균증의 치료

[용법 및 용량]

대상동물	용법	용량 및 투약기간
닭	음수(경구)투여	물 1L당 본제 1ml의 비율로 음수에 희석하여 5일간 투여. 또는 체중 kg당 0.2ml(플로르페니콜로서 20mg)를 음수에 첨가하여 5일간 투여.
돼지		물 1L당 본제 1ml의 비율로 음수에 희석하여 5일간 투여. 또는 체중 10kg당 본제 1ml(플로르페니콜로서 100mg)을 음수에 첨가하여 5일간 투여.

[저장방법 및 유효기간]

저장방법	용기종류	유효기간
직사광선을 피하여 건조한 실온(1~30°C)에 보관	기밀용기	제조일로부터 24개월

[휴약기간]

닭 2일, 돼지 16일 (산란중인 닭에는 사용하지 마십시오)

