살균제

나라장터 종합쇼핑몰

(주)이-글벳 종합제품안내서

http://shopping.g2b.go.kr

보조사료

구충제

조달청

KOSDAQ
코스닥상장법인

건강축산의 동반자
주식회사 이-글벳

바이오팜-S

【사료의 성분등록번호】 제 CCBFX0005호 **【사료의 명칭】** 혼합성 보조사료 3 **【사료의 형태】** 가루

【사료의 종류】 보조사료 / 혼합제 **【사료의 용도】** 배합사료원료용, 양축농가용

【사료의 성분량】 본제 1kg 중
락토바실러스 애시도필러스 ····· 1.5×10^{10} cfu/kg 이상
락토바실러스 프란타럼 ····· 1.0×10^{10} cfu/kg 이상
셀룰라아제 ····· 2500 unit/kg 이상
부형제 : 이스트컬춰 ····· 780g
유카추출물 ····· 적량

【사료의 적용】
- 장내 유익 세균총의 증가
- 항병력과 면역력 증진
- 연변개선 효과
- 식욕증진
- 분변의 악취완화로 사육환경 개선
- 분변의 신속한 발효로 파리발생 감소
- 체세포수 감소
- 산유량 증가 및 유지율 향상
- 수송스트레스 완화
- 사료의 기호성 증진
- 성장촉진 및 사료효율 개선
- 도체등급 개선

【사용방법】 다음 용량을 사료에 섞어 투여한다
- 축우 : 두당 10~20g(사료톤당 1~2kg)
- 모돈, 자돈, 육성 · 비육돈 : 사료톤당 1~2kg
- 육계, 산란계, 종계, 오리 : 사료톤당 1~2kg
- 송아지, 자돈 등 대용유 투여동물 : 대용유 톤당 10~20kg

【휴약기간】 없음 **【포장단위】** 5kg/포

이글 아이지 골드

【사료의 성분등록번호】 제 CCBFX0021 호 **【사료의 명칭】** 혼합성 보조사료 14 **【사료의 형태】** 페이스트

【사료의 종류】 보조사료 / 혼합제 **【사료의 용도】** 배합사료원료용, 양축농가용

【사료의 명칭 또는 용도】 혼합제(바실러스 서브틸리스 등과 그 합제)19 (실수요자용)

【사료의 성분량】 (1g 중)
바실러스 서브틸리스 ····· 2.5×10^{8} cfu/g
타우린 ····· 10mg/g 이상
부형제 : IgY(특이난황분말) ····· 적량
플락토올리고당 ····· 적량
허브, 천연감미료 ····· 적량

【사료의 적용】 갓 태어난 송아지에 유익생균 보충
- 소화관 미생물총의 균형조절
- 점막층과 장내 세포벽의 안정화
- 유익균 증식 및 유해세균 억제작용
- IgY(대장균, 살모넬라, 헬리코박터) 공급
- 소화율 개선, 일당증체 증가 등 생산성 향상

【사용방법】
- 갓 태어난 송아지에 1 시린지 투여
- 장이 약해져 속이 불안정할 땐 1일 두당 1시린지씩 2~3일간 투여

【휴약기간】 없음 **【포장단위】** 10g×5/상자

이글 멀티컬쳐 E

【사료의 성분등록번호】 제 CCBTN0001 호 **【사료의 명칭】** 제빵효모 1 **【사료의 형태】** 가루

【사료의 종류】 보조사료 / 미생물제-유익효모 **【사료의 용도】** 사료원료용, 양축농가용

【사료의 성분량】
사카로미세스 세르비시애(Saccharomyces cerevisiae) ····· 1.0×10^{7} cfu/g 이상
부형물질 : 유카추출물, 해초분 등

【사료의 적용】
- 정장작용(장내유해세균 흡착배출)
- 가축의 식욕증진
- 소화율개선(프로테아제 효소생성)
- 설사방지
- 비육의 품질향상(육질 · 육색개선, 소화율개선)
- 환경개선 효과(암모니아 가스저하)
- 기호성 우수
- 사료효율 개선
- 항병력과 면역력 증진

【사용방법】
- 축우 : 두당 20g(사료톤당 2kg)
- 육계, 산란계, 종계, 오리 : 사료 톤당 1~2kg
- 모돈, 자돈, 육성비육돈 : 사료 톤당 1~2kg

【휴약기간】 없음 **【포장단위】** 5kg/포, 20kg/포

뉴베타핀플러스

【사료의 성분등록번호】 제 CCBFX0023 호 **【사료의 명칭】** 혼합성 보조사료 16

【사료의 종류】 보조사료 / 혼합제 **【사료의 용도】** 배합사료원료용, 양축농가용

【사료의 형태】 가루

【사료의 성분량】 1kg 중
비테인 ····· 200g/kg 이상
비타민 C ····· 50g/kg 이상
부형물질 : 베타글루칸 100g, 건조효모 100g, 비타민 E, 비타민 B_1, 망간, 철, 아연 등

【사료의 적용】
- 스트레스(혹서기, 혹한기) 개선
- 간기능개선
- 면역력 증강
- 번식력 향상
- 삼투압조절제 기능
- 골격계 기능유지
- 생산성 개선
- 백신스트레스 완화

【사용방법】
- 축우 : 두당 20g(사료톤당 2kg)
- 육계, 산란계, 종계, 오리 : 사료톤당 1~2kg
- 모돈, 자돈, 육성 · 비육돈 : 사료톤당 1~2kg

【휴약기간】 없음 **【포장단위】** 5kg/포

베타핀솔

【사료의 성분등록번호】 제 CCBFX0026 호

【사료의 종류】 보조사료 / 혼합제

【사료의 형태】 액상

【사료의 명칭】 혼합성 보조사료 19

【사료의 용도】 배합사료원료용, 양축농가용

【사료의 성분량】 본제 1L 중
비테인 ····· 300g/L 이상
염화콜린 ····· 20g/L 이상

【특장점】
- 비테인, 콜린의 2중 복합 처방
- 사료효율개선 및 생산성 향상
- 고온 및 저온 스트레스 억제
- 강력한 항산화 효과로 인한 활력 증강
- 탈수개선효과
- 지방간의 개선, 이등유 방지
- 액상제제이기 때문에 물과 잘 혼합되고 체내 흡수가 빠르며 급여가 용이합니다.

【사용권장량】 (1일 기준)
- 산란계 : 5000~10000수 1~1.5L / 1,000리터
- 육 계 : 1~1.5L / 1,000리터
- 돼 지 : 1.5~2L / 1,000리터
- 젖 소 : 50mL / 성우 1두

【휴약기간】 없음 **【포장단위】** 1L/통, 5L/통

피그드림

【사료의 성분등록번호】 제 CCBFX0025 호 **【사료의 명칭】** 혼합성 보조사료 18 **【사료의 형태】** 가루

【사료의 종류】 보조사료 / 혼합제

【사료의 용도】 배합사료원료용, 양축농가용

【사료의 성분량】 본제 1kg 중

비타민 A …… 10,000 IU/kg 이상 비타민 E …… 25 IU/kg 이상

비타민 D3 ……4,400 IU/kg 이상 포도당 …… 400g/kg 이상

※부형물질 : 무수포도당, 혈장성분, 식물성오일, 동물성오일, 유산균, 비타민, 유지방, 미네랄 등 (수입원료 50% 함유)

- Crude Protein …… not less than …… 8.00%
- Crude Fat …… not less than …… 5.00%
- Crude Fiber …… not more than …… 0.25%
- Sodium(Na)…… not less than …… 0.39%(109.2mg/oz)
- Potassium(K) …… not less than ……0.33%(93.6mg/oz)
- Calcium(Ca) …… not less than ……0.30%(83.5mg/oz)
- Calcium(Ca) …… not more than …… 0.55%(154.7mg/oz)
- Phosphorus(P) …… not less than ……0.25%(70.9mg/oz)
- Magnesium …… not less than …… 0.03%(8.5mg/oz)

【사용방법】
- 비육, 육성돈 : 사료톤당 1~2kg
- 모돈, 자돈 : 사료톤당 2~3kg
- 육견 : 사료톤당 1~2kg

【사료의 적용】
- 육성돈, 비육돈 빠른 성장 촉진으로 조기 출하
- 혹서기 사료섭취량 증대
- 탈수예방 및 병후 회복 촉진
- 증체율향상, 이유자돈 위축방지
- 모돈의 영양 공급 및 유량 증가
- 항병력과 면역력 증진

【휴약기간】 없음

【포장단위】 1kg/포

② 구충제

http://shopping.g2b.go.kr ▼ | (주)이-글벳 검색 나라장터 종합쇼핑몰

이멕틴-원

【원료약품 및 분량】 본제 1mL 중

이버멕틴(Ivermectin, EP) …… 10mg 부형제 …… 적량

【효능 및 효과】
- 돼지 : 돈폐충, 돼지 이, 개선충/돼지 옴, 위장관내 선충류(돈회충, 적색위충, 장결절충류, 란솜간충, 돈편충, 요원충)
- 소 : 우폐충, 안충, 쇠파리 구더기, 소 이, 개선충/소 진드기, 위장관내 선충류(갈색위충, 염전위충, 모양선충류, 정상모양선충류, 장결절충, 우구충류, 세경모양선충류, 유두조충, 편충)

【용법 및 용량】
- 돼지 : 체중 33kg당 1mL를 피하주사
- 소 : 체중 50kg당 1mL를 피하주사

【휴약기간】 소 – 35일, 돼지 – 28일

【포장단위】 50mL/병

이글 이버멕틴 외용액

【원료약품 및 분량】 본제 1L 중

이버멕틴(Ivermectin, KVP) …… 5g

프로필렌글리콜(Propylene glycol, KVP) …… 8g

부형제…… 적당량

【효능 및 효과】 소의 내외부 기생충의 구제

【용법 및 용량】 체중 10kg당 본제 1mL을 피부 도포

【휴약기간】 소 – 35일

【포장단위】 100mL/병, 500mL/병

이글 콕시졸 5%현탁액

【원료약품 및 분량】 본제 1L 중

Toltrazuril(별규) …… 50.00g

부형제…… 적량

【효능 및 효과】
- 자돈 콕시듐의 감염에 의한 설사예방 및 치료
- 송아지의 콕시듐증 예방과 치료

【용법 및 용량】
- 3~7일령의 자돈에 본제 1mL를 1회 경구 투여하십시오.(동봉된 펌프의 1회 주입량은 1mL입니다)
- 송아지(5~6주령)는 체중 10kg당 3mL를 동봉한 펌프로 뽑아서 물, 전해질액 또는 대용유에 혼합하여 경구투여 하십시오.

【휴약기간】 자돈, 송아지 – 70일

【포장단위】 60mL/병

이멕틴-P

【원료약품 및 분량】 본제 1kg 중

Ivermectin(별규) …… 6.12g 부형제 …… 적량

【효능 및 효과】 돼지의 선충류(Ascaris suum, Ascarops strongylina, Hyostrangy rubidus, Oesophagostomum spp.) 및 돈폐충, 돈신충, 이, 개선충의 구제

【용법 및 용량】 구충시 이 제품을 다음의 용량으로 사료에 고르게 혼합하여 7일간 연속하여 경구투여 하십시오.

가.

대상동물	사료섭취량	이버멕틴 함량	용량 사료톤당 본제 혼합량
어린돼지 (40kg)	50g/kg 체중	2.0	333g/사료 ton
육성돈(40~100kg)	42g/kg 체중	2.4	400g/사료 ton
모돈 200kg	2.0kg/1일	10.0	1.67kg/사료 ton
	2.5kg/1일	8.0	1.33kg/사료 ton
	3.0kg/1일	6.7	1.11kg/사료 ton
웅돈 250kg	2.5kg/1일	10.0	1.67kg/사료 ton
	3.0kg/1일	8.3	1.39kg/사료 ton

나. 모돈 · 웅돈에 개체 투여할 경우는 다음의 공식에 의하여 본제의 혼합량을 계산하여 구충할 돼지가 7일간 섭취할 사료에 혼합하여 투여하십시오.

*이멕틴-P = $\frac{\text{평균체중(kg)} \times \text{구충할 돼지(마리)} \times 7\text{(일)}}{60}$

【휴약기간】 돼지 – 도축전 28일

【포장단위】 500g/포

케이원

【원료약품 및 분량】 본제 1kg 중

Potassium monopersulfate (별규)	500.0g	Sodium dodecylbenzene sulfonic acid (별규)	150.0g
DL-Malic acid (식첨)	100.0g	Sodium hexametaphosphate (별규)	181.0g
Sodium chloride (대한약전)	15.0g	식용색소 적색 제2호 (식첨)	적량
Sulfamic acid (별규)	50.0g	레몬미크론(별규)	적량

【효능 및 효과】
가. 본제에 감수성이 있는 병인체의 살멸 및 소독
1) 바이러스 : 조류인플루엔자바이러스, 뉴캣슬병바이러스, 돼지열병바이러스, PED바이러스, 구제역바이러스,
2) 세　　균 : 일반세균(*Salmonella typhimurium*), 브루셀라(*Brucella abortus*)
나. 축사 및 축산기구의 소독

【용법 및 용량】
가. 아래 표의 배율로 희석하여 소독한다.
나. 소독대상이 충분히 젖도록 고르게 살포한다.

권장희석배수									
소독대상	대상질병명		일반 세균	특정 세균	특정 바이러스				
			Salmonella typhimurium	*Brucella abortus*	조류 인플루엔자	뉴캣슬	돼지열병	PED	구제역
	시험결과	경수(경)	1:1,080	1:960	1:3,000	1:3,000	1:3,000	1:500	1,000배
		유기물(유)	1:90	1:90	1:800	1:500	1:400	1:300	
유기물이 적은 소독대상	축사공간 및 기구, 일반차량 등	[일반세균(경)+특정(경)]	1,080배	960배	3,000배	3,000배	3,000배	500배	
유기물이 많은 소독대상	축사바닥, 오물, 사체, 농장차량 및 운반용구 등	[일반세균(유)+특정(유)]	90배	90배	800배	500배	400배	300배	

※권장희석배수의 표기 : 일반세균(*S. typhimurium*)과 특정 세균, 특정 바이러스의 경수와 유기물에서의 시험결과를 비교하여 높은 농도를 권장희석배수로 정함.
※희석방법예시
• 100배 희석이란? 물 100L(약5말)에 본제 1kg을 녹이는 것
• 500배 희석이란? 물 500L(약25말)에 본제 1kg을 녹이는 것
• 1,000배 희석이란? 물 1,000L(약50말)에 본제 1kg을 녹이는 것

【휴약기간】 없음　　**【포장단위】** 1kg/포

케이투

【원료약품 및 분량】 본제 1L 중
N-알킬디메틸벤질암모늄클로라이드(Benzalkonium chloride 로서) ····· 100g
구연산 ····· 200g
부형제 ····· 적량

【효능 및 효과】
가. 본제에 감수성이 있는 병인체의 살멸 및 소독
1) 세　　균 : 일반세균(*Salmonella typhimurium*), 브루셀라균(*Brucella ovis*)
2) 바이러스 : 조류인플루엔자바이러스(AIV), 뉴캣슬병바이러스(NDV), 돼지열병바이러스(CSFV), 돼지유행성설사병바이러스(PEDV), 구제역바이러스(FMDV)
나. 축사 및 축산기구의 소독

【용법 및 용량】

권장희석배수									
소독대상	대상질병명		일반 세균	특정 세균	특정 바이러스				
			Salmonella typhimurium	*Brucella ovis*	조류 인플루엔자	뉴캣슬	돼지열병	PED	구제역
	시험결과	경수(경)	1:280	1:1000	1:250	1:250	1:400	1:150	1,000배
		유기물(유)	1:140	1:400	1:200	1:150	1:300	1:150	
유기물이 적은 소독대상	축사공간 및 기구, 일반차량 등	[일반세균(경)+특정(경)]	280배	1000배	250배	250배	400배	150배	
유기물이 많은 소독대상	축사바닥, 오물, 사체, 농장차량 및 운반용구 등	[일반세균(유)+특정(유)]	140배	400배	200배	150배	300배	150배	

※단, 일반세균(*S. typhimurium*)과 특정 세균, 특정 바이러스를 동시에 소독하고자 할 경우 가장 높은 소독제 농도를 권장합니다.
※희석방법예시
• 140배희석 ┌ 물 140L(약 7말)에 본제 약 1L를 희석하는 것
　　└ 물 20L(약 1말)에 본제 약 150mL를 희석하는 것
• 250배희석 ┌ 물 250L(약 13말)에 본제 약 1L를 희석하는 것
　　└ 물 20L(약 1말)에 본제 약 80mL를 희석하는 것

【휴약기간】 없음　　**【포장단위】** 1L/통, 5L/통, 20L/통