

소염진통해열제, 구충제 및 기타 광범위 내외부 구충제

E-mectin One Inj.

이멕틴-원



1회 투여로 내외부 기생충을 동시에 구제합니다. 이글만의 기술력으로 뼈뺀함을 개선했습니다. 투약노동력, 스트레스는 최소, 구충효과는 최대로 발휘합니다. 또한 증체율향상으로 비육기간이 단축됩니다.

주사제

동물용 의약품

■ 성분 및 함량

본제 1mL 중
Ivermectin10mg

■ 포장단위

100mL, 200mL

■ 휴약기간

- 소 : 35일
- 돼지 : 28일

효능 및 효과

- 소 : 위장관내 선충류(갈색위충(*Ostertagia* spp.), 염전위충(*Haemonchus placei*), 모양선충류(*Trichostrongylus* spp.), 정상모양선충류(*Cooperia* spp.), 장결절충(*Oesophagostomum radiatum*), 우구충류(*Bunostomum* spp.), 세경모양선충류(*Nematodirus* spp.), 유두조충(*Strongyloides papillosus*), 편충(*Trichuris* spp.), 폐충, 안충, 소 구더기, 소 이, 개선충, 소 진드기의 구제
- 돼지 : 위장관내 선충류(돈회충(*Ascaris suum*), 적색위충(*Hyostrongylus rubidus*), 장결절충류(*Oesophagostomum* spp.), 란숨간충(*Strongyloides ransomi*), 돈편충(*Trichuris suis*), 요원충(*Ollulanus tricuspis*), 폐충, 돼지 이, 개선충, 돼지 옴의 구제

용법 및 용량

- 소 : 체중 50kg당 1mL를 피하주사
- 돼지 : 체중 33kg당 1mL를 피하주사

주의사항

- 본제를 근육주사나 정맥주사하지 마십시오.
- 비유중인 젖소 및 분만 전 35일 이내의 젖소에는 투여 하지 마십시오.
- 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

