

영양제 및 대사촉진제 속효성대사촉진제

Eagle Catofull Inj.

이글 카토폴 주



동물용 의약품

■ 성분 및 함량

본제 1mL 중
 Butaphosphan100mg
 비타민 B₁₂0.05mg

■ 포장단위

100mL

■ 휴약기간

없음



이글 카토폴(주)는 체내 거의 모든 대사과정을 촉진시켜 각종 질병과 스트레스로 인하여 발생하는 활력저하를 신속히 개선시켜줍니다.

1. 이글 카토폴은 효과적입니다.
2. 이글 카토폴은 모든 대사작용을 촉진시켜주며 작용후 신속히 배출됩니다.
3. 이글 카토폴의 비타민 B₁₂는 각종 영양소의 이용률을 높여주며, 혈액생산을 촉진하고 동물의 성장을 촉진시켜 줍니다.
4. 이글 카토폴은 식욕, 활력을 증진시켜 항병력을 높여주어 빠른 치유를 유도합니다.

효능 및 효과

- 소, 말, 산양, 면양, 돼지, 개, 고양이, 닭
 - 급성 질병 및 급성 대사장애, 가벼운 마비증, 식욕부진, 비유량 감소, 사역 후의 피로회복, 어린 동물의 허약증, 말의 요통, 갈습부족 등에 대한 치료시 보조처방
 - 만성 질병 및 만성 대사장애, 어린 동물의 발육부진 및 성장촉진, 허약증, 영양결핍증, 부적절한 사료급여에 의한 대사장애, 불임증, 기생충 감염시 2차적 빈혈증
 - 건강한 동물의 활력증진 및 저항력 증진
- 닭 : 사료효율개선, 증체개선(성장촉진), 활력증진, 산란율 및 난자질 개선, 폐사율감소, 스트레스시 저항력증진, 카니발리즘 예방, 환우기간 단축

용법 및 용량

다음 용량을 정맥, 근육 또는 피하주사하며, 닭에서는 음수에 희석하여 경구투여한다. 만성질환 및 건강한 동물의 경우 1/2 용량으로 1~2주 간격으로 반복투여.

대상 동물	용량 및 투여기간	대상 동물	용량 및 투여기간
돼지	2.5~10.0mL	소, 말	5.0~25.0mL
포유자돈	1.0~2.5mL	송아지, 망아지	5.0~12.0mL
개	0.5~5.0mL	산양, 면양	2.5~5.0mL
고양이	0.5~2.5mL	어린양	1.5~2.5mL
산란계, 종계	수당 0.5mL를 2~7일간 투여	육계	수당 0.3mL를 5일간 투여

※만성질환 및 건강한 동물(성계수당)

산란계	0.25mL	육계	0.15mL
-----	--------	----	--------

※양계투약조건표

구분		1000수당 투여량
산란계	초생추	100mL
	중, 대추	150mL
	성계	250mL
육계	초생추, 전기	100mL
	후기	150mL