

항생·항균제 최신 합성 항균제

Enprotil-100 Inj. 엔프로틸-100



알칼리성제제로 활성이 높고 안정성이 뛰어납니다.
다른 항균제들보다 훨씬 낮은 저농도에서 강력한 살균작용을 나타냅니다.
흡수가 빠르며 각종 장기 및 체액으로의 약제 침투가 매우 높아 치료효과가 뚜렷합니다.

주사제

동물용 의약품

■ 성분 및 함량

본제 1mL 중
Enrofloxacin.....100mg

■ 포장단위

100mL

■ 휴약기간

- 소 : 비육우(정맥주사 4일, 피하주사 20일), 육우(정맥주사 3일)
- 돼지 : 20일

효능 및 효과

| 대상 동물 | 적응증 |
|-------|--|
| 소 | 대장균증(설사, 폐혈증, E. coli), 마이코플라스마증(Mycoplasma bovis), 살모넬라증(Salmonella typhimurium), 파스튜렐라성 폐렴(Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica) |
| 돼지 | 대장균증(설사증, 장독혈증, E.coli), 마이코플라스마성 폐렴(Mycoplasma hyopneumoniae), 살모넬라증(Salmonella typhimurium, Salmonella derby), 파스튜렐라성 폐렴(Pasteurella multocida), 홍막폐렴(Actinobacillus pleuropneumoniae) |

용법 및 용량(1일 체중 10kg 당)

| 질병 | 소(파하 또는 정맥주사) | 돼지(근육주사) |
|-------------|---------------|-------------|
| 일반 세균성 질병 | 0.25mL씩 3일 | 0.25mL씩 3일 |
| 중증 호흡기, 소화기 | 0.5mL씩 3~5일 | 0.5mL씩 3~5일 |
| 살모넬라증 | 0.5mL씩 3~5일 | 0.5mL씩 3~5일 |

주의사항

- 본제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.
- 연골성장 이상, 간장애 및 신장장애가 있는 동물에게는 투여하지 마십시오.

