

수산용 동물용의약품  
휴약기간 준수



옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료

**수산전용**

# OTC 500산



- 슬방울병
- 절창병
- 비브리오병
- 아가미 부식병
- 세균성 출혈성 패혈증
- 슈도모나스병
- 지느러미 적병
- 류결절증
- 궤양병

1 kg

**KOSDAQ**  
코스닥 상장법인



건강축산의 동반자  
**주식 회사 이-클 벳**

수신자요금부담전화 : 080-022-6644 [www.eaglevet.com](http://www.eaglevet.com)

수산용 동물용의약품  
휴 약 기 간 준 수

수산전용  
**OTC 500산**

1 kg

■ 원료약품 및 분량 (본제 1 kg 중)

옥시테트라사이클린염산염 (Oxytetracycline Hydrochloride, KVP)··· 500 g(역가)      부형제·····적당량

■ 효능 및 효과

옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료

가. 송어(연어과어류) : 아가미부식병 (Flavobacterium columnare), 비브리오병(Vibrio anguillarum), 절창병(Aeromonas salmonicida), 궤양병(Hemophilus piscium), 세균성출혈성패혈증(Aeromonas liquefaciens), 슈도모나스병(Pseudomonas sp.)

나. 잉어 : 비브리오병(Vibrio anguillarum), 슬방울병(Aeromonas hydrophila)

다. 방어 : 류결절증(Photobacterium damsela subsp. piscicida)

라. 메기 : 세균성출혈성패혈증(Aeromonas liquefaciens), 슈도모나스병(Pseudomonas sp.)

마. 뱀장어 : 지느러미적병(Aeromonas punctata)

바. 참돔 : 비브리오병(Vibrio anguillarum)

■ 용법 및 용량

가. 경구투여시(사료 혼합)

어종	질병명	본제로서 투약량 (g/어체중 ton당/일)	옥시테트라사이클린으로서 투약량(g/어체중 ton당/일)	투약기간 (일)
송어	아가미부식병	165	82.7	10
	비브리오병	20-100	10-50	3-7
	절창병	110-165	55.1-82.7	10
	궤양병	110-165	55.1-82.7	10
	세균성출혈성패혈증	110-165	55.1-82.7	10
	슈도모나스병	110-165	55.1-82.7	10
잉어	비브리오병	20-100	10-50	3-7
	슬방울병	100-200	50-100	5

어종	질병명	본제로서 투약량 (g/어체중 ton당/일)	옥시테트라사이클린으로서 투약량(g/어체중 ton당/일)	투약기간 (일)
방어	류결절증	60-140	30-70	5
메기	세균성출혈성패혈증	110-165	55.1-82.7	10
	슈도모나스병	110-165	55.1-82.7	10
뱀장어	지느러미적병	20-100	10-50	3-7
참돔	비브리오병	20-100	10-50	3-7

나. 약욕시

어종	질병명	본제로서 투약량 (g/물 ton당)	옥시테트라사이클린으로서 투약량(g/물 ton당)	투약기간 (분)
참돔	비브리오병	50	25	30-60

■ 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 직사광선을 피하고 건조한 실온(1-30℃)에 보관

■ 사용상의 주의사항

가. 다음 어류에는 투여하지 말 것 : 본제 및 Tetracycline계 항생제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 어류에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용 : Tetracycline계 약물을 장기간 투여 시 비감수성 세균 및 진균의 과잉성장을 초래할 수 있습니다.

다. 상호작용 : Cephalosporin계, Penicillin계 및 다른 Tetracycline계 항생제와 병용하지 마십시오.

라. 적용상의 주의 : 사료에 혼합하여 투여할 경우 균질하게 혼합되지 않으면 약화사고를 초래하거나 투여목적 달성을 할 수 없으므로 골고루 잘 혼합하여 사용하십시오.

마. 휴약기간 : 송어-30일, 잉어-25일, 방어-20일, 메기-30일, 뱀장어-30일, 참돔-20일(약욕시 5일)

바. 저장상의 주의사항

- 1) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 2) 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정해진 저장방법을 준수하십시오.
- 3) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
- 4) 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래 포장용기를 밀봉하여 습기와 광선이 차단된 장소에 보관하십시오.
- 5) 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

나. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

사. 권고사항

- 1) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- 2) 수의사 또는 수산질병관리사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 4) 지정된 어종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 5) 오남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.
- 6) 오남용에 의한 약화사고 및 수산식품에 잔류 등 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 정해진 용법용량을 준수하십시오.
- 7) 남용에 의해 약화사고와 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 본제를 투여 하면서 동시에 동일성분의 약품을 중복투여하지 마십시오.
- 8) 휴약기간을 준수하지 않을 경우 어체에 약물이 잔류될 수 있으므로 시간까지 정확히 계산하여 준수하십시오.
- 9) 취급자는 장갑, 마스크, 보호의 등 보호장구를 착용하여 직접적인 피부접촉이나 흡입을 피하여 주십시오.
- 10) 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상 증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 11) 제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신 경우 제조사 또는 수입사로 연락하여 주시기 바랍니다.



KOSDAQ  
코스닥상장법인



건강축산의 동반자  
주식회사 이-클 벵

서울사무소 : 서울시 성동구 광나루로 6길 20 이클타운8층 TEL:02)464-9065(代)  
본사·공장 : 충남 예산군 신암면 추사로 235-34 TEL:041)331-4100(代)

제 조 번 호 :  
제 조 일 자 :

유효 기 간 : 제조일로부터 24개월