



수산전용

에리설트림

♡ *Aqua Erysultrim* ♡

에리스로마이신/설파디아진/트리메토프림
합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료

연쇄구균증
비브리오병
에드워드병

절창병
세균성신장병
세균성아가미병



부식병
기적병
궤양병
출방울병



■ 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)

에리스로마이신(Erythromycin thiocyanate, 별규)	180g(역가)
설파디아진나트륨(Sulfadiazine Sodium, KVP)	150g
트리메토프림(Trimethoprim, KVP)	30g
포도당(Glucose, KVP)	적당량

■ 효능 및 효과

에리스로마이신, 설파디아진 및 트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 1) 방어 | 2) 넙치 | 3) 조피볼락 |
| - 연쇄구균증(Lactococcus garvieae) | - 연쇄구균증(Streptococcus sp.) | - 연쇄구균증(Streptococcus sp.) |
| - 비브리오병(Vibrio anguillarum) | - 비브리오병(Vibrio anguillarum) | - 비브리오병(Vibrio ordalii) |
| 4) 송어(연어과어류) | 5) 뱀장어 | 6) 잉어 |
| - 세균성신장병(Renibacterium salmoninarum) | - 기적병(지느러미적병, Aeromonas hydrophila) | - 솔방울병(입린병, Aeromonas hydrophila) |
| - 비브리오병(Vibrio anguillarum) | - 부식병(아가미부식병, Flavobacterium columnare) | - 궤양병(Aeromonas salmonicida) |
| - 절창병(Aeromonas salmonicida) | - 궤양병(Aeromonas salmonicida) | - 연쇄구균증(Streptococcus sp.) |
| - 세균성아가미병(Favobacterium blanchiphilum) | - 세균성아가미병(Favobacterium blanchiphilum) | |
| - 부식병(지느러미부식병, Flavobacterium columnare) | - 부식병(지느러미부식병, Flavobacterium columnare) | |

■ 용법 및 용량

어체중 1톤당 본제 100~200g/일을 사료에 고르게 혼합하여 2~5일간 경구투여

■ 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 직사광선을 피하고 건조한 실온(1~30°C)에 보관

나. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

■ 사용상의 주의사항

가. 다음 어류에는 투여하지 말 것 : 본제 및 Macrolide계 항생제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 어류에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용 : 본제를 6일 이상 연속투여 시 섭이량 저하, 섭이거부, 행동, 체력저하, 경련, 설사 등의 이상이 나타날 수 있습니다.

다. 상호작용 : Lincosamide계 및 다른 Macrolide계 항생제와 병용하지 마십시오.

라. 적용상의 주의사항 : 사료에 혼합하여 투여할 경우 균질하게 혼합되지 않으면 약화사고를 초래하거나 투여목적을 달성할 수 없으므로 골고루 잘 혼합하여 사용하십시오.

마. 휴약기간 : 방어, 넙치, 조피볼락, 송어(연어과어류), 뱀장어, 잉어 – 30일

바. 저장상의 주의사항

1) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.

2) 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.

3) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.

4) 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래 포장용기를 밀봉하여 습기와 광선이 차단된 장소에 보관하십시오.

5) 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

사. 기타(권고사항)

1) 본 제품은 수산용 동물용의약품으로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.

2) 수의사 또는 수산질병관리사의 지시에 따라 사용하십시오.

3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.