

암프롤리움과 에토파베이트의 절묘한 만남

COCCI Plus-E

콕시플러스-E

- Powerful Synergic Activity

..... 강력한 상승 효과

- Broad Spectrum Reaction

..... 광범위한 항콕시둠 작용

- Good Solubility


..... 탁월한 용해도 실현

- No Residue

..... 무잔류 안전 계육 생산

- Non - Toxic

..... 믿을 수 있는 안전성 확보



건강 축산의 기수
주식 회사 이-글 벳

소비자상담전화 : 080-022-6644 www.eaglevet.com

COCCIPLUS-E


콕시플러스-E에 함유된 2가지 약효성분의 특징은 각각 단일로 작용할 때보다 합쳐질 경우 강력한 항콕시둠 작용을 발휘하여 증상이 심하고 폐사율이 매우 높은 맹장콕시둠은 물론 증체율과 사료효율을 떨어뜨리는 각종 소장콕시둠까지 신속한 제압이 가능하며 장기간의 액상제법 연구를 통해 안정성이 높고 용해도가 우수하여 급수관의 막힘없이 안심하고 사용하실 수 있도록 설계하였습니다.



BROAD SPECTRUM

콕시플러스-E에 함유된 암프롤리움은 잘 알려진 항원충작용의 화합요법 제로 맹장콕시둠에 특히 효과가 뛰어나지만 상대적으로 소장콕시둠에는 취약한 단점이 있습니다. 이러한 단점을 보완하기 위해 살파제와 약리기 전은 유사하지만 암프롤리움과 만나면 강력한 살원충 작용을 발휘하는 에토파베이트를 처방하였습니다.

그리므로 콕시플러스-E는 국내에서 가장 발생빈도가 높은 4대 콕시둠 원충인 맹장콕시둠 (*Eimeria tenella*), 소장콕시둠 (*E. acervulina*, *E. maxima*, *E. necatrix*) 모두에 효과적으로 작용하는 광범위 콕시둠증 치료제입니다.



암프롤리움 + 에토파베이트의
강력한 상승작용



콕시플러스-E COCCI Plus-E 콕시플러스-E COCCI Plus-E


MODE OF ACTION



COCCI Plus-E



콕시플러스-E의 암프롤리움은 7일간의 콕시둠 생활환 중 1~3일에 해당하는 1차 무성생식기와 2차 무성생식기 초기사이에 작용하여 콕시둠 증식에 필수적인 티아민의 이용을 차단하는 역할을 합니다. 또한 에토파베이트는 엽산과 구조가 유사한 Para-Aminobenzoic acid(PABA)의 구조적 길항작용제로서 콕시둠이 핵산을 가장 많이 필요로 하는 시기인 2차 무성생식기(4~5일)에 주로 작용하므로 결국 초기 무성생식기부터 유성생식기 초반까지 폭넓게 작용합니다.



FIELD TRIAL EFFICACY

콕시플러스-E의 암프롤리움+에토파베이트 처방은 세계적으로 항콕시둠 효과가 입증이 되었으며 콕시둠의 권위자 Chapman 박사는 3가지 항콕시둠제를 이용한 효능시험에서 암프롤리움+에토파베이트를 투여한 군에서 가장 우수한 효과를 나타내었음을 증명하였습니다.

야외에서 분리한 맹장콕시둠을 감염시킨 닭에 투여된 항콕시둠제들의 효과비교 (H. D. Chapman, 1989)

약제종류	증체중 (g)	야외감염 *	
		폐사율	평균병변성적
톨트리주릴	38.9	0	2.4
설파퀴녹살린+피리메타민	45.9	0	2.0
암프롤리움+에토파베이트	54.2	0	1.2
무투약 대조군	6.6	45	3.7

* 맹장콕시둠은 4가지 분리주가 혼합된 자료임.

콕시플러스-E **COCCI Plus-E** **콕시플러스-E** **COCCI Plus-E**

암프롤리움과 에토파베이트의 절묘한 만남

COCCI Plus-E

콕시플러스-E

원료약품 및 분량

본제 1L 중

Amprolium HCl	240.0g
Ethopabate	15.2g
부형제	적량

효능 및 효과

가금의 콕시동증 예방 및 치료

용법 및 용량

- 중증시 : 본제 100ml를 음수 100ℓ에 5 ~ 7일간 투여
- 경증시 : 본제 50ml를 음수 100ℓ에 5 ~ 7일간 투여
- 예방시 : 본제 25ml를 음수 100ℓ에 용해하여 계속 급여

저장방법 및 사용기간

- 저장방법 : 기밀용기에 실온(1~30°C)에서 건조하고 차광된 장소에 보관할 것.
- 사용기간 : 제조일로부터 24개월

주의사항

- 휴약기간 : 1일
- 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 지정된 축종이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 사용하지 마십시오.
- 안전성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 본제를 음수에 희석한 후에는 가급적 빨리 사용하십시오.

포장단위

500ml, 1L



건강 축산의 기수
주식 회사
아-클-벳

서울사무소 : 서울시 성동구 성수2가3동 278-20 이글타운8층 TEL : 02)464-9065
본사공장 : 충남 예산군 신원면 두곡리 256-48 TEL : 041)331-4100
www.eaglevet.com