

송아지 콕시듐증 예방 및 치료

이클 콕시졸

5% 현탁액

“엄마의 약손”

「맛이 좋아 잘 먹고~ 빠르다!」

콕시듐치료
및 예방을 위한
조성물 특허
(특허제 10-1242535호)
기술을 활용한
제조

설사(원충성)로 부터의
비용으로 부터의
투약스트레스로 부터의

FREE
자유!



40kg 송아지 5두분 용량

콕시졸은...

- 콕시듐의 모든 성장단계에 작용합니다.
- 면역형성을 방해하지 않습니다.
- 투약시 추가 보강치료가 필요하지 않습니다.
- 진행된 감염(3~5일 후)도 성공적으로 치료할 수 있습니다.
- 효과는 감염정도에 무관하게 일관된 효능을 보입니다.
- 투약스트레스가 적습니다.
- 투약여부 감별이 쉽습니다.



... 여러분은
콕시듐으로부터
자유로우십니까? ...




통계에 의하면 국내 많은 농장이 콕시듐에 감염되어 있습니다.

- ▶ 콕시듐의 경우 포자울 형성하기 때문에 소독약 등 외부환경에 저항성이 큼니다.
- ▶ 한번 감염되면 결코 쉽게 사라지지 않고 오랫동안 농장의 성적을 저하시킵니다.
- ▶ 설사나 증체저하가 확연하게 나타난다면 적극적인 치료를 하겠지만, 오염정도가 낮은 농장은 증상이 심하지 않아 인식하기 어렵기 때문에 더 큰 피해를 입게 됩니다.
- ▶ 콕시듐이 장점막세포(용모세포)에 침입하여 용모세포의 기능이 떨어지게 되고 성장을 지연시킵니다.
- ▶ 용모세포가 파괴되어 대장균 등의 세균이 쉽게 침투하여 2차 감염이 증가합니다.
- ▶ 한번 감염되면 보충숙주(원충을 간직하고 있는 송아지)가 되어 평생 오염원이 됩니다. 즉, 콕시듐 충란을 지속적으로 배설하여 농장 전체를 오염시키고 심각한 경제적 손실을 초래합니다.



송아지 콕시듐증 예방 및 치료제



「맛이 좋아 잘 먹고~ 빠른 이글 콕시졸」

■ 성분 및 함량 (본제 1L 중)

Toltrazuril(별규) 50.00g
부형제 적량

■ 효능 및 효과

송아지의 콕시듐증 예방과 치료

■ 용법 및 용량

송아지(5~6주령)는 체중 10kg당 3mL를 동봉한 펌프로 뽑아서 물, 전해질액 또는 대용유에 혼합하여 경구투여 하십시오.

■ 주의사항

1. 휴약기간 : 송아지-70일
2. 제품에 기입된 사용설명(주의사항)을 충분히 읽어 본 후 사용하십시오.

■ 포장단위

60mL

KOSDAQ
코스닥상장법인



건강축산의 동반자
주식회사 이글벳

서울사무소 : 서울시 성동구 광나루로 6길 20 이글타운8층 TEL:02)464-9065(代)
본사·공장 : 충남 예산군 신암면 추사로 235-34 TEL:041)331-4100(代)