




사/료/첨/가/용/광/범/위/내/외/부/구/충/제



경 2009년도 동물용의약품 수출업체 최우수상 수상 축

- 업계최초 국무총리상 수상
- 농림수산식품부장관상 수상
- 2010 우수기업인상 수상
- 2011 유망중소기업 지정

이멕틴-P[®]



내·외부 기생충과의 한판 승부!!

내부기생충 뿐만 아니라 외부기생충인

이, 개선충까지 확실한 구제

증체량 및 사료효율 향상

간편한 투약



돼지웁(개선충)은 돼지의 모든 성장단계에 영향을 미치며 특히, 육성돈이나 비육돈이 이에 심하게 감염될 경우 일당 증체율이 나빠지며 사료섭취량이 증가하게 됩니다.

개선충의 구제는 감염된 돈군 전체를 동시에 구충하는게 가장 효과적인 방법으로, **이멕틴-P**는 주사제에 의한 번거로움을 제거해 주고, 사료에 혼합급여가 용이하여, 돈군전체를 한번에 구충하며, 내부기생충까지 광범위하게 확실히 구충해주는 제제입니다.

KOSDAQ
코스닥상장법인



건강축산의 동반자
주식회사 이-클 벳

소비자상담전화 : 080-022-6644
www.eaglevet.com

사 / 료 / 첨 / 가 / 용 / 광 / 범 / 위 / 내 / 외 / 부 / 구 / 충 / 제

특장점

- 광범위하며 가장 효과적인 내·외부 종합구충제 (육성돈을 포함한 모든 돈군의 개선충까지 구제)
- 사료첨가제로 주사제처럼 개체 구충을 시도할 필요가 없으므로 투여가 편리하여 노동력 절감.
- 주사에 의한 부작용 및 스트레스 제거. • 장내에 흡수가 빠르고, 조직내에서 높은 농도를 유지함.
- 사료효율 및 증체율 향상. • 이유두수 증가.

성분 함량

본제 1kg중

Ivermectin 6.12g

부형제 적량

효능 효과

돼지의 선충류(Ascaris suum, Ascarops strongylina, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp.) 및
돈폐충, 돈신충, 이, 개선충의 구제

용법 용량

구충시 이 제품을 다음의 용량으로 사료에 고르게 혼합하여 7일간 연속하여 경구투여 하십시오.

가.

대상동물	이버멕틴 함량 (ppm)	용량 사료톤당 본제 혼합량
어린돼지 (40kg)	2.0	333g/사료 ton
육성돈 (40~100kg)	2.4	400g/사료 ton
모돈 200kg	10.0	1.67kg/사료 ton
	8.0	1.33kg/사료 ton
	6.7	1.11kg/사료 ton
웅돈 250kg	10.0	1.67kg/사료 ton
	8.3	1.39kg/사료 ton

나. 모돈·웅돈에 개체 투여할 경우는 다음의 공식에 의하여 본제의 혼합량을 계산하여 구충할 돼지가 7일간 섭취할 사료에 혼합하여 투여하십시오.

$$* \text{이맥틴 - P} = \frac{\text{평균체중 (kg)} \times \text{구충할 돼지(마리)} \times 7(\text{일})}{60}$$

저장방법 및 사용기간 : 차광된 실온에서 보관, 제조일로부터 24개월

주의사항 : 분만전 28일 이전에는 투약하지 마십시오.

휴약기간 : 돼지 - 5일

포장단위 : 1kg × 10EA

이맥틴 - P의 구충프로그램

- * 모돈, 웅돈 : 봄(3~4월), 가을(9~10월) 전 두수 정기 구충 (보맥틴 주 1ml/33kg 체중)
- * 포유모돈 : 자돈 이유시 자돈과 함께 구충 (보맥틴 주 1ml/33kg 체중)
- * 후보돈 : 종부 14~21일전 투약 (보맥틴 주 1ml/33kg 체중)
분만전 14~21일전 투약 (보맥틴 주 1ml/33kg 체중)
- * 비육돈 : 체중 25kg 이상시 이맥틴-P로 구충 (7일간)