

섞으면 다 편안해집니다.



속효성 아목시실린 분말주사

목사믹스





1회로 끝내는 광역 콕테일 주사제

$\frac{1}{3}$ 로 줍니다.

- 접종 스트레스 : $\frac{1}{3}$
- 시간 스트레스 : $\frac{1}{3}$
- 먼지 스트레스 : $\frac{1}{3}$

이글 콕테일 주사 프로그램

해열, 진통, 진경, 소염, 항생을 하나로...



| 항생제 치료는 |

- 주사바늘을 자주 갈아 주사바늘에 의한 바이러스 교차 감염을 줄여 주십시오. (돈방당 1개 이상 충분히)
- 최소한 3일 이상 매일 치료를 해 주십시오.
- 치료 용량을 줄여 항생제 내성을 키우지 말고 권장량을 접종하십시오.



건강축산의 동반자
주식회사 이글벳

소비자상담전화 : 080-022-6644

속효성 아목시실린 분말주사 목사믹스

■ 원료약품 및 분량 [본제 1.2g 중]

아목시실린나트륨(항생물질의약품기준) ----- 1,000mg(역가)

■ 효능 및 효과

아목시실린에 감수성이 있는 아래 질병에 대한 예방 및 치료

: 연쇄상구균(Streptococcus), Penicillinase를 생성하지 않는 포도상구균 (Staphylococcus), 탄저균(Bacillus anthracis), 클로스트리디움 (Clostridium), 코리네박테리움(Corynebacterium), 대장균(E. coli), 브루셀라(Brucella), 헤모필루스 (Haemophilus), 파스튜렐라(Pasteurella), 모락셀라(Moraxcella), 돈단독(Erysipelothrix rhusiopathiae), Fusiformis, 보데텔라(Bordetella), Diplococci, Micrococci, 그리고 Sphaerophorus necrophorus 등에 의한 위장관염, 호흡기감염, 비노생식기감염, 대장균성 유방염과 바이러스 감염증에 나타나는 2차 세균성 감염증

■ 용법 및 용량

사용전 주사용수를 주입하여 충분히 흔들어 내용물을 완전히 용해시킨 후 다음 용량을 근육주사한다.

가. 대상동물 : 소, 돼지

나. 투여용량

- 1) 일반적인 사용 : 체중 10kg당 본제 1mL(100mg/mL)씩 1일 1회 3일간 주사
- 2) 심한 경우의 적용 : 부작용이 없을 경우 1일 2회씩 주사
- 3) 단, 동일 주사부위에는 20ml 이하로 투여

■ 포장단위

1g(역가), 2g(역가), 5g(역가), 10g(역가), 20g(역가)

■ 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 밀봉용기에 넣어 8~25°C의 건조하고 빛이 차단된 곳에서 보관

나. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

■ 주의사항

가. 휴약기간 : 소, 돼지 - 25일

나. 금기사항

- 1) 착유우에는 사용하지 마십시오.
- 2) 페니실린에 과민성이 있거나, 신장기능이 심하게 손상된 가축에는 사용하지 마십시오. 만일 알려지반응이 나타날 경우, 즉시 에피네프린이나 스테로이드제를 투여하십시오.
- 3) Penicillinase 생성 병원균에 의한 감염에는 사용하지 마십시오.
- 4) 신생가축과 토끼, 기니픽 같은 작은 초식동물에는 사용하지 마십시오.
- 5) 테트라사이클린, 클로람페니콜, 설파제 등 속효성 약제와는 병용하지 마십시오.

다. 부작용

- 1) 과민반응에 의한 쇼크가 일어날 수 있습니다.

라. 사용상의 주의사항

- 1) 수의사의 지시 및 처방에 따라 사용하십시오.
- 2) 사용 전 사용설명서를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 3) 사용 전 충분히 흔들어 완전히 용해시킨 후 사용하십시오.
- 4) 사용자에 과민반응 또는 접촉성 피부염이 나타날 수 있으므로 약제가 피부에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 5) 사용하고 남은 약제는 밀봉하여 냉장실에 보관하고, 재사용시 약제의 이상이 없는지 확인하고 이상이 없을 시에만 사용하십시오.
- 6) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 사용하지 마십시오.
- 7) 정해진 용법·용량을 준수하지 않을 경우 오남용에 의한 약화사고 및 경제적 손실을 초래할 수도 있습니다.
- 8) 남용에 의한 약화사고와 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 본제를 투여하면서 동시에 동일성분의 약품을 중복 투여하지 마십시오.
- 9) 오·남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.
- 10) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않는 안전한 곳에 보관하십시오.
- 11) 안전성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 12) 유효기간이 경과한 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기 처리하십시오.
- 13) 기타 제품에 대하여 문의사항이 있으신 경우 구입처나 제조사에 연락하여 주시기 바랍니다.



서울사무소 : 서울시 성동구 성수2가3동 278-20 이클타운8층 TEL:02)464-9065

본사공장 : 충남 예산군 신암면 두곡리 256-46 TEL:041)331-4100

www.eaglevet.com