

[원료약품 및 분량] (본제 1L 중)

[유효성분]

엔로플록사신(Enrofloxacin, 별규) 200g

[보존제]

수산화칼륨(Potassium Hydroxide, KVP).... 적당량

부틸알코올(Butyl Alcohol, KVP) 적당량

[첨가제] 주사용수

[효능 및 효과]

엔로플록사신에 감수성이 있는 아래 세균성 질병 치료

- 넙치 :

연쇄구균증(*Streptococcus parauberis*)

- 조피볼락 :

연쇄구균증(*Streptococcus iniae*),

에로모나스증(*Aeromonas salmonicida*)

[용법 및 용량]

- 넙치, 조피볼락 :

어체중 1톤당 본제 50mL(엔로플록사신으로 10g)

를 사료에 혼합하여 1일 1회 7일간 경구투여

[저장방법 및 유효기간]

가. 저장방법 : 직사광선을 피하여 실온

(~30°C)에 보관

나. 유효기간 : 제조일로부터 24개월



서울사무소 : 서울시 강동구 풍납로길 20 일대우 7-8층 TEL:02464-9065~9067(㈹)
본사·공장 : 충남 예산군 신암면 주사로 235-34 TEL:041)331-4100(㈹)
수신자부담전화:080-022-6644 / www.eaglelevel.com

1L

수산용 엔프로틸 200액 Aqua Enprotil 200 sol.

(엔로플록사신)

엔로플록사신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료



[주의사항]

가. 유효기간 - 유효기한 : 90일, 조피볼락 : 80일

나. 다음의 어류에는 사용하지 마십시오.
항생물질에 대한 쇽크와 과민반응이 있었던 어류에는
사용하지 마십시오.

다. 성분작용

여러 항생물질과 병용하지 마십시오.

라. 사용禁忌 주의사항

1) 사용 전 충분히 흔들어서 사용하십시오.
2) 서로에 혼합하여 투여할 경우 균질하게 혼합되지 않으면
약화사고를 초래하거나 투여목적을 달성할 수 없으므로
절 혼합하여 사용하십시오.

3) 특약 후 이상증상을 보일 경우 투약을 중단하고 수산질병
관리사 또는 수의사와 상담하십시오.

※ 허가용량 초과 투여 시 어류 체내 간장 및 신장독성이
나타날 수 있음

4) 오 - 남용에 의한 약화사고 및 수산식품에 잔류 등 경제적
손실을 초래할 수 있으므로 경제진 용법·용량을 반드시 준수하십시오.

마. 저장상 주의사항

1) 안전하고 밤지를 위하여 어의 손이 닿지 않고, 동물의
접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.

2) 유효성 및 안정성이 변화를 초래 할 수 있으므로 정하여진
저장방법을 준수하십시오.

3) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게
폐기 처리하십시오.

4) 오용 및 품질저하 방지를 위하여 공급된 용기나 포장지
이외의 다른 용기에 소분하여 보관하지 마십시오.

5) 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로
사용하지 마십시오.

6) 개봉한 제품은 기급적 빨리 사용하십시오.

바. 기타

1) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

2) 수산질병관리사 또는 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

3) 본 제품은 수산용 동물용의약품으로 사람에게는 절대
사용하지 마십시오.

4) 지정된 수산동물 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어
있지 않으므로 임으로 사용하지 마십시오.

5) 오남용 및 내성출현 예방을 위하여 수산용 동물용의약품의
사용내역을 반드시 기록하십시오.

6) 분비제·동일성분의 약품을 중복투여하지 마십시오.

7) 유효기간을 준수하지 않을 경우 어류 체내에 약물이 잔류
될 수 있으므로 정확히 계산하여 준수하십시오.

8) 취급자는 장갑·마스크 및 보호의 등 보호장구를 착용하여
약물의 적극적인 피부접촉이나 흡입을 피하십시오.

9) 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉된 경우는 즉시 씻어내고
이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

10) 기타 제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신 경우 제조

사로 연락해 주시기 바랍니다.

제조번호 :
제조일자 :
유효기한 :



Size : 170X140

513C