

처방대상 애완동물용의약품



이글 울혈성 심부전 치료제 피모벤단 정

피모벤단(Pimobendan) ?



트로포닌 C에 대한 칼슘의 반응을 증가시킴으로써 심근 수축력을 증가시킴



PDE3의 억제를 통해 혈관을 확장시킴으로써 심장의 후부하(Afterload)를 감소시킴

울혈성 심부전 치료제



포장단위_120정

EAGLE VET

“이글 피모벤단 정이 특별한 이유!”



» 이글벳의 엄격한 품질 관리를 통한 제조

- ✓ 50년 역사 동물용의약품 제조 업체
- ✓ KVGMP 품질관리 우수업체
- ✓ 업계 최초 유럽 수출 인증 업체

이글 피모벤단 정

원료약품 및 분량

(본제 1정 당)
 [유효성분]
 피모벤단 (Pimobendan, EP) 5mg
 [첨가제]
 실리콘 디옥사이드, 미결정셀룰로오스, 시트르산무수물, 유당수화물, 포도당, 옥수수전분, 스테비오사이드, 포비돈 K90, 스테아르산 마그네슘, 저치환도히드로시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 정제수

효능 및 효과

가. 대상동물 : 개
 나. 확장성 심근염이나 판막부전(승모판 및 삼첨판 역류) 등으로 인한 울혈성 심부전의 치료

용법 및 용량

가. 체중 kg당 피모벤단 0.2mg-0.6mg을 증상 완화시까지 경구투여
 나. 일일 최적 권장 용량은 체중 kg당 피모벤단 0.5mg으로(이글 피모벤단 정 5mg정으로서 체중 10kg당 1정), 이를 2회의 투여 분량으로 나누어(0.25mg/kg) 1/2 은 오전, 나머지 1/2은 12시간 후 경구투여 (이뇨제와 함께 투여가능)

저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 실온(1 ~ 30°C)에 직사광선을 피하여 건조한 곳에 보관
 나. 용기종류 : 기밀용기
 다. 유효기간 : 제조일로부터 36개월

주의사항

- 1) 수의사의 처방에 따라 사용하십시오.
- 2) 비대성 심근염이나 기능적 원인 또는 대동맥 협착과 같은 해부학적 원인에 의하여 심장 박출량의 증가가 일어날 수 없는 상태인 경우에는 사용하지 마십시오.
- 3) 사료와 함께 투여하거나 사료급이 직후 투여 시에는 약효가 상당히 감소하므로 적어도 사료급이 1시간 전에 투여하십시오.



(주)이글벳

충남 예산군 신암면 추사로 235-34 TEL:041)331-4100(대)
 수신자부담전화:080-022-6644 / www.eaglevet.com