



# Hepanitol Sol.

## 헤파니톨 액



- 01 간기능 개선
- 02 일당증체량(ADG), 사료효율 개선
- 03 성장촉진
- 04 산란율의 개선



### [원료약품 및 분량] 본제 1L 중

L-카르니틴(L-Carnitine, 식물첨가물공전).....	10g	시트르산수화물(Citric Acid Hydrate, KVP).....	3g
D-소르비톨(D-Sorbitol, KVP).....	400g	시트르산나트륨수화물(Sodium Citrate Hydrate, KVP).....	15g
콜린염화물(Choline Chloride, KVP).....	150g	정제수(Purified water, KP).....	적당량
소르비산칼륨(Potassium Sorbate, KVP).....	5g		

### [효능 및 효과]

- 1) 간기능 개선
- 2) 일당증체량(ADG), 사료효율 개선
- 3) 성장촉진
- 4) 산란율의 개선

### [용법 및 용량]

- 다음 용량을 경구 투여
- 기금 : 물 1L당 1mL를 음수에 혼합하여 5~10일간 경구 투여
- 소, 돼지, 양, 낙타 : 물 1L당 1mL를 음수에 혼합하여 5~10일간 경구 투여

### [저장방법 및 유효기간]

- 가. 저장방법 : 실온(1~30°C)에 직사광선을 피하여 건조한 곳에 보관
- 나. 사용기간 : 제조일로부터 24개월

### [사용상의 주의사항]

- 가. 사용상 주의사항
  - (1) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
  - (2) 최대 사용기간은 21일을 넘지 않도록 한다.
  - (3) 오, 남용에 의한 악화사고 및 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 본제를 투여하면서 동시에 동일성분의 약품을 중복투여하지 마십시오.
  - (4) 남용에 의한 악화사고와 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 본제를 투여하면서 동시에 동일성분의 약품을 중복 투여하지 마십시오.
  - (5) 본 약제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 동물에게는 사용하지 마십시오.
- 나. 기타 주의사항
  - (1) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
  - (2) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
  - (3) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
  - (4) 안정성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
  - (5) 유효기간이 경과한 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
  - (6) 오, 남용 예방을 위하여 동물약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.
  - (7) 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.
  - (8) 오물 및 품질저하 방지를 위하여 공급된 용기나 포장지 이외의 다른 용기에 소분하여 보관하지 마십시오.
  - (9) 본제는 공기와 장기간 접촉 시 역기저하의 우려가 있으므로 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래 포장지에 밀폐하여 습기와 광선이 차단되는 장소에서 보관하십시오.
  - (10) 기타 제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신 경우 제조사로 연락하여 주시기 바랍니다.