



후마길 산

(후마길린)

Fumagil Powder

꿀벌 노제마병의 예방과 치료



EAGLE VET



후마길 산

(후마길린)

Fumagil Powder

꿀벌 노제마병의 예방과 치료

원료약품 및 분량

(본제 1kg 중)

[유효성분]

후마길린(Fumagillin bicyclohexylamonium, 별규) 20g(역가)

[첨가제]

폴리에틸렌글리콜 6000(Polyethylene Glycol 6000, KP) 적당량

인산수소이나트륨(Disodium Phosphate, EP)..... 적당량

인산이수소나트륨(Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate, EP) 적당량

효능 및 효과

꿀벌 노제마병(Nosema apis)의 예방과 치료

용법 및 용량

가. 봄철 치료

노제마(Nosema) 감염시 아래의 방법 중 한가지 방법을 선택하여 투여

1) 본제 25g을 아래의 사양수에 희석하여 그 희석액을 8주 동안 매주 아래의 양으로 투여한다.

소비매수	사양수량	희석액 1회 투여량
8매 이상	25L	1L
4~7매	18L	0.75L
3매	12L	0.5L

2) 봉군 전체 동시 치료 시 : 1)의 희석액을 급수기에 넣는다.

나. 가을철 치료

‘가’의 방법대로 투여하되, 마지막 월동 사양 급여 전에 본제가 모두 소비될 수 있도록 일찍 시작한다.

다. 여왕벌의 사육지와 수정 상태에서 사용 방법

본제 5g을 소량의 물에 용해시켜 Sugar paste(꿀+가루백설탕) 3kg과 혼합하여 투여한다.

라. 노제마(Nosema) 포자가 소비와 벌통에 남아 있으면 다음해 봄과 여름에 재치료한다.

저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 실온(1~30℃)에 직사광선을 피하여 건조한 곳에 보관

나. 사용기간 : 제조일로부터 36개월

사용상의 주의사항

• 휴약기간 : 해당없음

단, 본제 사용 시 아래 사항은 반드시 준수할 것

• 유밀기 직전이나 유밀기 중에는 사용하지 마십시오.

• 봄철 및 가을철에 본제를 사용하여 사양 관리한 벌꿀은 정리 채밀하여 식용목적으로 사용하지 마십시오.

EAGLE VET

(주)이글벳

충남 예산군 신암면 추사로 235-34 TEL:041)331-4100(대)

수신자부담전화:080-022-6644 / www.eaglevet.com