

KVGMP
품질관리
우수업체



양봉용 동물용의약품

응애제로액

꿀벌응애(Varroa sp.) 방지 및 구충



EAGLE VET

꿀벌응애 방지 및 구충을 위한 선택!
천연 살충제 응애제로액

응애제로액

원료약품 및 분량 (본제 1L 중)

[유효성분]

시트르산수화물(Citric Acid Hydrate, KVP)..... 17g

프로폴리스(Propolis, 벌규) 2.5g

[첨가제 성분]

백당(Sucrose, KVP) 242g

에탄올(Ethanol, KVP) 7.5mL

폴리소르베이트 80(Polysorbate 80, KVP)..... 7.5g

정제수(Purified Water, KP) 적량

효능 및 효과

대상동물	효능·효과
꿀벌	꿀벌응애(Varroa sp.) 방지 및 구충

용법 및 용량

대상동물	용법						
꿀벌	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 전에 본제를 따뜻하게(약 25~30℃) 하여 잘 흔들어준 후 투여 • 외부기온이 12℃이상이고, 벌들이 활동할 때는 모든 벌 무리가 귀소한 후 저녁 무렵에 투여 • 외부기온이 12℃이상이고, 벌들이 활동하지 않는 시기에는 따뜻한 시간대에 투여 • 소비와 소비 사이에 벌이 많이 모여 있는 벌무리 위쪽에 약액을 흘리는 방식으로 투여 						
대상동물	용량 및 투약기간						
꿀벌	<table border="1"> <thead> <tr> <th>사용시기</th> <th>사용량 (소비 1 매당 본제 1mL 를 기준으로 투여)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>산란기</td> <td>6~7일 간격으로 한번씩 연속 4회 투여</td> </tr> <tr> <td>비 산란기</td> <td>1회 투여</td> </tr> </tbody> </table>	사용시기	사용량 (소비 1 매당 본제 1mL 를 기준으로 투여)	산란기	6~7일 간격으로 한번씩 연속 4회 투여	비 산란기	1회 투여
	사용시기	사용량 (소비 1 매당 본제 1mL 를 기준으로 투여)					
	산란기	6~7일 간격으로 한번씩 연속 4회 투여					
비 산란기	1회 투여						

EAGLE VET

(주)이글벳

충남 예산군 신암면 추사로 235-34 TEL:041)331-4100(대)

수신자부담전화:080-022-6644 / www.eaglevet.com