


플로톤 산


Floton powder




3가지 성분의 복합 처방 산제

- ✓ 항생제 + 해열 진통제 + 비타민 성분으로 연령 무관 호발하는 호흡성 질환에 강력한 효과
- ✓ 개별 주사에 비해 인건비 및 돼지의 주사 스트레스 감소 ↓
- ✓ 짧은 휴약기간(3일)으로 편리한 적용
- ✓ 임상시험을 통한 효능 확인 완료

총 증체량 ✓ ($p < 0.001$)



사료 효율 ✓ ($p < 0.001$)



플로톤 산

Floton powder



플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 및 증상의 완화(해열 및 진통)

원료약품 및 분량

(본제 1kg 중)

[유효성분]	
플로르페니콜(Florfenicol, 별규)	40g
아스피린(Aspirin, KVP)	300g
아스코르브산(Ascorbic Acid, KVP)	50g
[첨가제]	
말분(Wheat shorts, 별규)	적당량
석회석분말(Ground limestone, 별규)	적당량

효능 및 효과

플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 및 증상의 완화(해열 및 진통)

가. 대상동물 : 돼지

나. 유효균종 : Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae

다. 적응증

- 위축성 비염, 파스튜렐라성 폐렴, 흉막폐렴 등 돼지의 호흡기질환(SRD)의 치료
- 호흡기질환(SRD)을 동반한 발열과 동통의 해열 및 진통

용법 및 용량

대상동물 : 돼지

- 체중 kg당 본제 50 mg(플로르페니콜로서 2mg, 아스피린으로서 15mg, 아스코르브산으로서 2.5mg) 1일 1회 7일간 경구 투여
- 사료 톤당 본제 1kg(플로르페니콜로서 40g, 아스피린으로서 300g, 아스코르브산으로서 50g)을 혼합하여 1일 1회 7일간 경구 투여

휴약기간

돼지 3일

유효기간

제조일로부터 24개월



EAGLE VET

(주)이글벳

충남 예산군 신암면 추사로 235-34 TEL:041)331-4100(代)
수신자부담전화:080-022-6644 / www.eaglevet.com