




CELMANAX™

셀마낙스 / 셀마낙스 액

속효성 질병 회복력 구축 솔루션




생후 30일 이하의 송아지의 57%는 설사로 인해 폐사합니다.¹

설사를 예방하고, 스트레스 조건에서도 생산성을 유지할 수 있습니다.



✓ 축우 건강 유지



✓ 축우 생산성 향상




✓ 생산비 감소




#ScienceHearted

EAGLE VET




테스트 결과



셀마낙스를 사용했을 때 와포자충의 감염 발생률, 감염 시 증상의 심각도 및 지속 기간이 감소하였습니다.^{4, 5}



셀마낙스를 사용했을 때 로타바이러스($P=0.03$), 살모넬라($P=0.03$)의 유병률이 감소하였습니다.



사용방법

[셀마낙스]

- 젖소: 하루 두당 투여량
 - 1) 3~6개월: 7g
 - 2) 6~12개월: 14g
 - 3) 전환기, 건유기: 56g
 - 4) 비유기: 28g
- 소: 하루 두당 투여량
 - 1) 암소: 18g
 - 2) 3~7개월: 7g
 - 3) 7개월~: 28g

[셀마낙스 액]

- 젖소: 하루 두당 투여량
 - 1) 신생 송아지 대용유, 이유기: 8mL
 - 2) 육성기(3~12개월): 10mL
 - 3) 전환기, 건유기: 28mL
 - 4) 비유기: 14mL
- 소: 하루 두당 투여량
 - 1) 암소: 14mL
 - 2) 신생 송아지 대용유, ~113kg: 8mL
 - 3) 육성기(113~226kg): 10mL
 - 4) 비육기: 9mL



#ScienceHearted

EAGLE VET

(주)이글벳

충남 예산군 신암면 추사로 235-34 TEL:041)331-4100(代)
수신자부담전화:080-022-6644 / www.eaglevet.com

1 Cho Y, Yoon K. An overview of calf diarrhea – infectious etiology, diagnosis and intervention. J of Vet Sci 2014;15(1):1-17.