





마이코플라즈마와 PRRS, 둘 다 잡는 **스마트 솔루션!**



아이브로신-50 Aivlosin-50

틸바로신으로 완성되는 호흡기 건강





아이브로신-50

Aivlosin-50

타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료

[원료약품 및 분량] (본제 1 kg 중)

아세틸이소바레릴타일로신타르타르산(Acetylisovaleryltylosin Tartrate, 별규1) 50g(역가)
 탈지강(Defatted Rice Bran, 별규2) 적당량

[효능 및 효과]

타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료

대상 동물	효능·효과
닭	마이코플라즈마병(<i>Mycoplasma gallisepticum</i>) 전염성 관절막염(<i>Mycoplasma synoviae</i>)
돼지	마이코플라즈마성 폐렴(<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>)

[용법 및 용량]

대상 동물	용량 및 투약기간
닭	일일 사료 1ton당 본제 4~10kg(타일로신으로서 200~500g)의 비율로 희석하여 3~5일간 경구투여
돼지	일일 사료 1ton당 본제 0.4~1kg(타일로신으로서 20~50g)의 비율로 희석하여 7일간 경구투여

[저장방법 및 유효기간]

- 가. 저장방법 : 실온(1~30℃)의 건암소에 보관
- 나. 유효기간 : 제조일로부터 24 개월

[휴약기간]

- 1) 닭 : 5일(* 산란계 사용금지) (* 산란개시 2주 전부터 사용하지 말 것)
- 2) 돼지 : 3일

